

## Дозы и режимы введения препарата Цефоперазон производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Нозокомиальная пневмония	Взрослые: 1-2 г каждые 8-12 часов +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения Дети: 80 мг/кг/сутки в 2 введения +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения,	в/в или в/м в/в или в/м в/в или в/м в/в или в/м	10-14 дней
Интраабдоминальные инфекции, в т.ч. вторичный перитонит	Взрослые: 2 г каждые 8-12 часов + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов Дети: 80 мг/кг/сутки в 2 введения + метронидазол 22,5 мг/кг/сутки в 3 введения Новорожденные: 30 мг/кг каждые 12 часов + метронидазол 7,5-15 мг/кг каждые 12 часов	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в в/в в/в	7-10 дней
Инфекции желчевыводящих путей (холангит, холецистит)	Взрослые: 1-2 г каждые 8-12 часов + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов Дети: 80 мг/кг/сутки в 2 введения + метронидазол 22,5 мг/кг/сутки в 3 введения	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в	7-10 дней
Острый пиелонефрит Послеоперационные инфекции МВП	Взрослые: 1-2 г каждые 8-12 часов Дети: 80 мг/кг/сутки в 2 введения	в/в или в/м в/в или в/м	14 дней
Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин	2 г каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов +/- доксициклин 100 мг каждые 12 часов	в/в или в/м в/в или per os в/в или per os	10-14 дней
Сепсис (источник – брюшная полость, органы малого таза), а также билиарный сепсис	Взрослые: 2-4 г каждые 8-12 часов + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов Дети: 100-200 мг/кг/сутки в 2-3 введения + метронидазол 22,5 мг/кг/сутки в 3 введения Новорожденные: 35-40 мг/кг каждые 12 часов + метронидазол 7,5-15 мг/кг каждые 12 часов	в/в в/в в/в в/в в/в в/в	10-14 дней