

## Дозы и режимы введения препарата Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 5% производства ОАО «Красфарма»

Показание	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
<p>Кровотечение во время и после хирургических вмешательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в урологии (операции на мочевом пузыре и простате)</li> <li>- в гинекологии (операции на шейке матки)</li> <li>- абдоминальная хирургия (операции на желудке и кишечнике)</li> <li>- торакальная хирургия (операции на легких и бронхах)</li> <li>- нейрохирургия</li> </ul> <p>Кровотечения в стоматологии у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию или страдающих гемофилией</p> <p>Акушерские кровотечения (преждевременная отслойка плаценты, осложненный аборт)</p> <p>Жизнеугрожающие кровотечения при передозировке тромболитиков (в т.ч. стрептокиназы)</p> <p>Кровотечения на фоне тромбоцитопении, тромбопенической пурпуры, лейкемии</p> <p>Гематурия при заболеваниях мочевыводящих путей (в т.ч. вторичная при цистите)</p> <p>Обильные менструации, меноррагия, геморрагическая метропатия</p> <p>Кровотечения из расширенных вен пищевода у пациентов с циррозом печени</p>	<p>Взрослые: 4-5 г (100 мл раствора) однократно в течение 1 ч., затем по 1 г каждый час (макс. суточная доза – 30 г)</p> <p>Дети от 0 до 18 лет: 100 мг/кг, или 3 г/кв. метр площади тела в течение часа, затем 33,3 мг/кг, или 1 г/ кв. метр площади тела в час.(макс. суточная доза 600 мг/кг, или 18 г/ кв. метр площади тела)</p>	<p>Медленная инфузия</p>	<p>до 24 часов</p>
<p>Профилактика пери-операционной кровопотери у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим вмешательствам</p>	<p>Взрослые: 75-100 мг/кг-(обычно 5-10 г) однократно в течение 1 ч., затем по 10-15 мг/кг/час (обычно – 1 г/час) во время операции</p> <p>или</p> <p>нагрузочная доза - 10 г, затем 2 г/час во время операции</p>	<p>Медленная инфузия</p>	<p>Периоперационно</p>
<p>Профилактика пери-операционной кровопотери у пациентов, подвергающихся хирургическим вмешательствам на позвоночнике</p>	<p>Взрослые: нагрузочная доза - 10 г, затем 2 г/час во время операции (до закрытия операционной раны)</p>	<p>Медленная инфузия</p>	<p>Периоперационно</p>
<p>Профилактика пери-операционной кровопотери у пациентов, подвергающихся тотальному эндопротезированию коленного сустава</p>	<p>Взрослые: 150 мг/кг до операции, затем по 12,5-15 мг/кг/час во время операции в течение 3-5 часов</p>	<p>Медленная инфузия</p>	<p>Периоперационно</p>