

Дозы и режимы введения препарата Амоксициллин+клавуланат производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Внебольничная пневмония, лечение в условиях стационара	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов +/-азитромицин 500 мг Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов +/- азитромицин 10 мг/кг/сутки (макс. доза 500 мг/сутки)	в/в внутрь в/в внутрь	7-10 дней
Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры (аспирационная пневмония, абсцессы легких, эмпиема плевры)	Взрослые: 1,2-2,4 г каждые 8 часов Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов +/- гентамицин 5 мг/кг в сутки (разделить на 2 введения)	в/в в/в в/в или в/м	21-42 дня, возможна ступенчатая терапия
Вторичный перитонит (в т.ч. аппендикулярный, послеоперационный)	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов	в/в	7-14 дней
Одонтогенные инфекции (абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств головы и шеи)	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов	в/в	10-14 дней
Инфекции кожи и мягких тканей (раневая инфекция, абсцессы, флегмоны, укушенные раны, некротизирующие инфекции)	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов	в/в	7-14 дней
Инфекции у пациентов с синдромом диабетической стопы	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов	в/в или в/м	7-10 дней
Осложненные инфекции МВП (пиелонефриты, пиелиты)	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов Дети#: 20-30* мг/кг каждые 8 часов	в/в	14 дней, возможна ступенчатая терапия
ВЗОМТ ^{&} Эндометриит (в т.ч. послеродовый) Пельвиоперитонит Амнионит	Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов	в/в	10-14 дней, возможна ступенчатая терапия
Периоперационная антибиотикопрофилактика (абдоминальная хирургия, колопроктология, травматология и ортопедия)	Взрослые: 1,2 г в/в за 30 мин до разреза Дети: 30* мг/кг в/в за 30 мин до разреза	в/в	

* - дозы у детей указаны из расчета на амоксициллин и клавуланат

- поскольку фторхинолоны противопоказаны у детей до 16 лет, Амоксициллин+клавулановая кислота является препаратом выбора для лечения тяжелых осложненных и неосложненных инфекций МВП в педиатрической практике

& - ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза у женщин