

Дозы и режимы введения препарата Ампициллин производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит (дети < 1 мес.)	<i>В возрасте 0-7 дней:</i> 50 мг/кг каждые 8 часов + гентамицин 2,5 мг/кг каждые 12 часов <i>или</i> +цефотаксим 50 мг/кг каждые 12 часов <i>В возрасте 8-28 дней:</i> 50 мг/кг каждые 6 часов + гентамицин 2,5 мг/кг каждые 8 часов <i>или</i> +цефотаксим 50 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в в/в в/в в/в	7-10 дней
Бактериальный менингит, вызванный <i>Listeria monocytogenes</i> , у взрослых	2 г каждые 4 часа + гентамицин 2 мг/кг – нагрузочная доза, затем 1,7 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в или в/м	10 дней
Эндокардит нативных клапанов (у пациентов, не являющихся в/в наркоманами)	Взрослые: 12 г каждые 12 ч + оксациллин 2 г каждые 4 ч + гентамицин 1 мг/кг каждые 8 часов	Длит. в/в инфузия в/в или в/м в/в или в/м	28 дней* 28 дней* 14 дней
Внебольничная пневмония (дети < 1 мес.)	<i>В возрасте 0-7 дней:</i> 25 мг/кг каждые 8 часов + гентамицин 2,5 мг/кг каждые 12 часов <i>В возрасте 8-28 дней:</i> 25 мг/кг каждые 6 часов + гентамицин 2,5 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в или в/м в/в в/в или в/м	14 дней
Вторичный перитонит (кроме послеоперационного) Абсцессы брюшной полости Дивертикулит	Взрослые: 2 г каждые 6 ч + метронидазол 500 мг каждые 8 часов +/- гентамицин 2 мг/кг – нагрузочная доза, затем 1,5 мг/кг каждые 8 часов, или 4,5 мг/кг каждые 24 часа	в/в в/в в/в или в/м	10-14 дней
Неосложненные ИМВП** (лечение в условиях стационара)	Взрослые: 2 г каждые 6 ч + гентамицин 2 мг/кг – нагрузочная доза, затем 1,5 мг/кг каждые 8 часов, или 4,5 мг/кг каждые 24 часа #	в/в или в/м в/в или в/м	14 дней
Осложненные ИМВП** (обструкция мочевых путей, азотемия, наличие катетера)	Взрослые: 2 г каждые 6 ч + гентамицин 2 мг/кг – нагрузочная доза, затем 1,5 мг/кг каждые 8 часов, или 4,5 мг/кг каждые 24 часа #	в/в или в/м в/в или в/м	14-21 день
ВЗОМТ& (эндометрит, сальпингит, тубоовариальный абсцесс и пельвиоперитонит) Послеродовый эндометрит Хориоамнионит	2 г каждые 6 ч + клиндамицин 450-900 мг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или в/м	10-14 дней
Гастроэнтерит, вызванный <i>Listeria monocytogenes</i> , у детей	50мг/кг каждые 6 часов	в/в	7-10 дней
Профилактика бактериального эндокардита у взрослых	2 г за 30 мин до вмешательства (операции), затем 1 г через 6 часов после введения первой дозы + гентамицин 1,5 мг/кг однократно за 30 мин до вмешательства (операции)	в/в в/в или в/м в/в или в/м	

* - при высеивании *Enterococcus* продолжительность введения ампициллина 8-12 нед.

- при единственном внутривенном доступе – вводить с как можно большим интервалом между инфузиями, или вводить через различные внутривенные катетеры

** - ИМВП – инфекции мочевыводящих путей

& - ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза у женщин