

**Дозы и режимы введения препарата Ампициллин+сульбактам
производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса**

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Вторичный перитонит (в т.ч. аппендикулярный) Дивертикулит Периректальный абсцесс	Взрослые: 3 г каждые 6 часов, или 4,5 г каждые 8 часов (максимальная суточная доза сульбактама – 4 г) Дети#: 200-300 мг/кг/сутки, разделить на 4 введения	в/в	7-10 дней
Эмпиема плевры Абсцесс легкого	Взрослые: 3 г каждые 6 часов Дети#: 200-300 мг/кг/сутки, разделить на 4 введения +/- гентамицин 5 мг/кг/сутки, разделить на 2 введения	в/в или в/м в/в или в/м в/в или в/м	21-42 дня, возможна ступенчатая терапия
Амнионит Эндометрит Септический аборт	Взрослые: 3 г каждые 6 часов (максимальная суточная доза сульбактама – 4 г)	в/в или в/м	7-10 дней
Осложненные ИМВП*, в т.ч. послеоперационные и у пациентов с катетерами	Взрослые: 3 г каждые 6 часов Дети#: 150-200 мг/кг/сутки, разделить на 4 введения	в/в или в/м	10-14 дней
Орхоэпидидимит у взрослых > 35 лет	Взрослые: 1,5 г каждые 6 часов	в/в или в/м	10-14 дней
Послеоперационные раневые инфекции Укушенные раны	Взрослые: 1,5-3 г каждые 6 часов Дети#: 150-300 мг/кг/сутки, разделить на 4 введения	в/в или в/м	7-10 дней
Сепсис	Взрослые: 3 г каждые 6 часов (максимальная суточная доза сульбактама – 4 г) Дети#: 300 мг/кг/сутки, разделить на 4 введения	в/в или в/м в/в или в/м	10-14 дней
Периоперационная антибиотикопрофилактика (травматология, акушерство, гинекология, абдоминальная хирургия)	Взрослые: 1,5-3 г за 30 мин. до разреза Дети: 50-75 мг/кг за 30 мин. до разреза	в/в в/в	

* - ИМВП – инфекции мочевыводящих путей

- дозы для детей старше 1 года