

Дозы и режимы введения препарата Цефепим производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит у детей старше 2 мес.	50 мг/кг каждые 8 часов	в/в	Зависит от возбудителя: <i>N. meningitidis</i> - 4 дня; <i>H. influenzae</i> - 6 дней; <i>S. pneumoniae</i> — 7 дней
Внебольничная пневмония, тяжелое течение	Взрослые: 1-2 г в/в каждые 12 часов +/- азитромицин 500 мг внутрь или (при невозможности приема препаратов <i>per os</i>) +/- азитромицин 500 мг	в/в внутрь	7-10 дней 3 дня
	Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов	в/в в/в	не более 5 дней 7-10 дней
Нозокомиальная пневмония, в т.ч. нозокомиальная пневмония у пациентов, находящихся на ИВЛ	Взрослые: 2 г каждые 12 часов +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения При подозрении на MR стафилококки + ванкомицин 500 мг каждые 6 часов	в/в или в/м в/в или в/м	14-21 день (до 42 дней при пневмонии, вызванной <i>Pseudomonas</i>)
	Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения При подозрении на MR стафилококки + ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 часов	в/в в/в или в/м в/в или в/м	
Интраабдоминальные инфекции, в т.ч. послеоперационный перитонит	Взрослые: 2 г каждые 12 часов + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов	в/в или в/м в/в	7-10 дней
	Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов + метронидазол 7,5 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в	
Гинекологические инфекции (септический аборт, эндометрит, в т.ч. послеродовый)	1-2 г каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или <i>per os</i>	7-10 дней
	+/- доксициклин 100 мг каждые 12 часов	в/в или <i>per os</i>	
Острый пиелонефрит Послеоперационные инфекции МВП	Взрослые: 1-2 г каждые 12 часов	в/в или в/м	10-14 дней
	Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов		
Сепсис (эмпирическая терапия)	Взрослые: 2 г каждые 12 часов +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения При подозрении на MR стафилококки + ванкомицин 500 мг каждые 6 часов	в/в или в/м в/в или в/м	10-21 день
	Дети*: 50 мг/кг каждые 12 часов +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в 1-2 введения При подозрении на MR стафилококки + ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 часов	в/в в/в или в/м в/в или в/м	
Фебрильная нейтропения	Взрослые: 2 г каждые 8 часов +/- ванкомицин 500 мг каждые 6 часов	в/в в/в	7-10 дней, или до разрешения нейтропении
	Дети*: 50 мг/кг каждые 8 часов +/- ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 часов	в/в в/в	

* - для детей старше 2 мес.