

## Дозы и режимы введения препарата Цефотаксим производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит	Взрослые: 2 г каждые 6 часов Дети: 50 мг/кг каждые 6 часов Новорожденные: 50 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в	Зависит от возбудителя: <i>N. meningitidis</i> - 4 дня; <i>H. influenzae</i> - 6 дней; <i>S. pneumoniae</i> — 7 дней.
Бактериальный эндокардит, вызванный НАСЕК ( <i>Haemophilus spp.</i> , <i>A. actinomycetemcomitans</i> , <i>Cardiobacterium hominis</i> , <i>E. corrodens</i> и <i>K. kingae</i> )	Взрослые: 2 г каждые 6 часов	в/в	4-6 нед.
Внебольничная пневмония	Взрослые: 1-2 г каждые 6-8 часов +/- азитромицин 500 мг 1 раз в сутки Дети: 50 мг/кг каждые 8 часов +/- азитромицин 10 мг/кг/сутки (макс. доза 500 мг/сутки); курсовая доза – 30 мг/кг	в/в или в/м внутри в/в или в/м внутри	7-10 дней 3 дня 7-10 дней 3 дня
Инфекции кожи и мягких тканей, в т.ч. раневая инфекция, инфекция у обожженных	Взрослые: 1 г каждые 6-8 часов Дети: 20-40 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или в/м	7-10 дней, не менее 10 дней при инфекции, вызванной <i>Streptococcus spp.</i>
Интраабдоминальные инфекции, включая вторичный перитонит	Взрослые: 1-2 г каждые 6-8 часов + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов Дети: 30-40 мг/кг каждые 8 часов + метронидазол 7,5 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в	7-10 дней
Септический (инфекционный, пиогенный) артрит	Взрослые: 1 г каждые 6-8 часов +/- ванкомицин 1 г каждые 12 ч Дети: 50 мг/кг каждые 8 часов +/- ванкомицин 20 мг/кг каждые 12 ч	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в	14-28 дней
Артрит, вызванный <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети: 50 мг/кг каждые 12 часов	в/в или в/м в/в или в/м	7 дней
Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин (ВЗОМТ)	Взрослые: 1-2 г каждые 8 часов + доксициклин 100 мг каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в или в/м внутри или в/в внутри или в/в	10-14 дней
Неосложненная гонорея	Взрослые: 0,5 г однократно	в/м	1 день
Диссеминированная гонорея	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа	в/в или в/м в/в или в/м	7 дней
Пиелонефрит острый или обострение хронического	Взрослые: 1-2 г каждые 8 часов Дети: 50 мг/кг каждые 12 часов	в/в или в/м в/в или в/м	До 14 дней
Сепсис	Новорожденные: 50 мг/кг каждые 8-12 часов + ампициллин 35-50 мг/кг каждые 6-8 часов Дети > 1 мес.: 50 мг/кг каждые 8 часов Взрослые: 2 г каждые 6-8 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в в/в в/в в/в	7-10 дней
Периоперационная антибиотикопрофилактика (урология, акушерство, гинекология, абдоминальная хирургия)	Взрослые: 1-2 г 30 мин. до разреза; <i>при операциях на толстой кишке</i> + метронидазол 0,5 г, начать инфузию за 60-90 мин. до операции	в/в в/в	