

Дозы и режимы введения препарата Цефтриаксон производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит	Взрослые: 2 г каждые 12 часов Дети: 50 мг/кг каждые 12 часов	в/в в/в	Зависит от возбудителя: <i>N. meningitidis</i> - 4 дня; <i>H. influenzae</i> - 6 дней; <i>S. pneumoniae</i> — 7 дней
Инфекционный эндокардит	Взрослые: 2 г каждые 24 часа	в/в или в/м	4 нед.
Внебольничная пневмония	Взрослые: 1-2 г каждые 24 часа +/- азитромицин 500 мг 1 раз в сутки Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа (макс. 2 г/сутки) +/- азитромицин 10 мг/кг/сутки (макс. доза 500 мг/сутки); курсовая доза – 30 мг/кг	в/в или в/м внутри в/в или в/м внутри	7-10 дней 3 дня 7-10 дней 3 дня
Интраабдоминальные инфекции, включая вторичный перитонит	Взрослые: 1-2 г каждые 24 часа + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа + метронидазол 7,5 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в	7-10 дней
Септический (инфекционный, пиогенный) артрит	Взрослые: 1 г каждые 24 часа +/- ванкомицин 1 г каждые 12 ч Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа +/- ванкомицин 20 мг/кг каждые 12 ч	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в	14-28 дней
Артрит, вызванный <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Взрослые: 1 г каждые 24 часа Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа	в/в или в/м в/в или в/м	7 дней
Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин (ВЗОМТ)	Взрослые: 1-2 г каждые 24 часа + доксициклин 100 мг каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в или в/м внутри или в/в внутри или в/в	10-14 дней
Неосложненная гонорея	Взрослые: 0,25 г однократно	в/м	1 день
Диссеминированная гонорея	Взрослые: 1 г каждые 24 часа Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа	в/в или в/м в/в или в/м	7 дней
Пиелонефрит острый или обострение хронического	Взрослые: 1 г каждые 24 часа Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа	в/в или в/м в/в или в/м	До 14 дней
Инфекции ЖКТ, вызванные <i>Salmonella</i> spp. (включая <i>S.typhi</i> и <i>S.paratyphi</i>), <i>E.coli</i> и <i>Y.enterocolitica</i> , в т.ч. диарейный синдром	Взрослые: 1-2 г каждые 24 часа Дети: 50 мг/кг каждые 24 часа	в/в или в/м в/в или в/м	7-10 дней
Сифилис	Взрослые: 0,5-1 г каждые 24 часа, при нейросифилисе – 2 г каждые 24 часа Дети: 75-100 мг/кг (макс. 4 г/сутки)	в/в или в/м в/в в/в или в/м	10-14 дней
Болезнь Лайма	Взрослые: 2 г каждые 24 часа, Дети: 50-80 мг/кг (макс. 4 г/сутки)	в/в или в/м в/в или в/м	14-21 дней
Периоперационная антибиотикопрофилактика (травматология, ортопедия, кардиохирургия, акушерство, гинекология, абдоминальная хирургия)	Взрослые: 1-2 г 30 мин. до разреза; <i>при операциях на толстой кишке</i> + метронидазол 0,5 г, начать инфузию за 60-90 мин. до операции Дети: 50 мг/кг за 30 мин. до разреза; <i>при операциях на толстой кишке</i> + метронидазол 7,5 мг/кг, начать инфузию за 60-90 мин. до операции	в/в в/в в/в в/в	