

Дозы и режимы введения препарата Цефуроксим производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. раневые инфекции, включая нагноение операционных ран)	Взрослые: 0,75 г каждые 8 часов Дети: 20 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или в/м	7-14 дней
Острый синусит Хронический синусит в стадии обострения	Взрослые: 0,5-1 г каждые 8 часов Дети: 10-20 мг/кг	в/в или в/м в/в или в/м	Не менее 10 дней; при обострении хронического синусита общая продолжительность антимикробной терапии 4-6 нед.
Внебольничная пневмония	Взрослые: 0,75-1,5 г каждые 8 часов Дети: 25-30 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или в/м	7-10 дней
Интраабдоминальные инфекции, включая вторичный перитонит (кроме послеоперационного)	Взрослые: 0,75-1,5 г каждые 8 часов + метронидазол 0,5 г каждые 8 часов в/в Дети: 25-30 мг/кг каждые 8 часов + метронидазол 7,5 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в в/в или в/м в/в	7-10 дней
Послеродовой эндометрит, септический аборт	Взрослые: 0,75-1,5 г каждые 8 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или внутрь	7-10 дней
Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин (ВЗОМТ)	Взрослые: 0,75-1,5 г каждые 8 часов + доксициклин 100 мг каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в или в/м внутрь или в/в внутрь или в/в	10-14 дней
Орхит, орхоэпидидимит	Взрослые: 0,75 г каждые 8 часов Дети: 25 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или в/м	общая продолжительность антимикробной терапии до 4 нед.
Пиелонефрит острый или обострение хронического	Взрослые: 0,75-1,5 г каждые 8 часов Дети: 25-30 мг/кг каждые 8 часов	в/в или в/м в/в или в/м	До 14 дней
Периоперационная антибиотикопрофилактика (травматология, ортопедия, кардиохирургия, акушерство, гинекология, абдоминальная хирургия)	Взрослые: 1,5 г 30 мин. до разреза; <i>при операциях на толстой кишке</i> + метронидазол 0,5 г, начать инфузию за 60-90 мин. до операции Дети: 25-30 мг/кг за 30 мин. до разреза; <i>при операциях на толстой кишке</i> + метронидазол 7,5 мг/кг, начать инфузия за 60-90 мин. до операции	в/в в/в в/в в/в	