

## Дозы и режимы введения препарата Ципрофлоксацин производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Гнойный перикардит (эмпирическое лечение)	400 мг каждые 12 часов + ванкомицин 1 г каждые 12 часов	в/в в/в	28 дней
Вторичный перитонит (в т.ч. аппендикулярный, послеоперационный) Абсцесс брюшной полости Дивертикулит	400 мг каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в в/в	7-14 дней
Острый холецистит Холангит	400 мг каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в в/в	10-14 дней
Гнойно-септические осложнения острого деструктивного панкреатита (панкреонекроза)	400 мг каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в в/в	14-28 дней
Осложненные ИМВП* (в т.ч. послеоперационный и у пациентов с катетерами)	400 мг каждые 12 часов	в/в	14-21 день, возможна ступенчатая терапия
Сибирская язва (кожная форма)	Взрослые: 400 мг каждые 12 часов Дети: 10-15 мг/кг каждые 12 часов	в/в	60 дней, рекомендуется ступенчатая терапия
Сибирская язва (легочная и желудочно-кишечная формы)	Взрослые: 400 мг каждые 12 часов Дети: 10-15мг/кг каждые 12 часов	в/в	60 дней, возможна ступенчатая терапия
Орхоэпидидимит (мужчины >35 лет)	400 мг каждые 12 часов	в/в	28 дней, возможна ступенчатая терапия
Злокачественный наружный отит	400 мг каждые 12 часов	в/в	28-56 дней, рекомендуется ступенчатая терапия
ВЗОМТ* (эндометрит, сальпингит, tuboовариальный абсцесс и пельвиоперитонит)	400 мг в/в каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в в/в или внутрь	14-21 день
Бактериемия, вызванная <i>Salmonella</i> spp., в т.ч. <i>S. typhi</i>	400 мг в/в каждые 12 часов	в/в	14 дней
Сепсис (эмпирическая терапия)	400 мг в/в каждые 12 часов +/- метронидазол 500 мг каждые 8 часов	в/в	14-21 день
Периоперационная антибиотикопрофилактика	400 мг, начать инфузию за 60 мин. до операции +/- метронидазол 500 мг, начать инфузию за 60-90 мин. до операции	в/в в/в	
Легочные инфекции у пациентов с муковисцидозом	Дети: 15 мг/кг каждые 12 часов  + цефтазидим 150-300 мг/кг в сутки, разделить на 2 введения	в/в  в/в (длит. инфузия)	14-21 день, возможна ступенчатая терапия  7 дней

# - ИМВП – инфекции мочевыводящих путей

& - ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза у женщин