

**Дозы и режимы введения препарата Имипенем+циластатин  
производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса  
(расчет дозы по имипенему)**

| Локализация инфекции                                                                                          | Доза и кратность введения                                                                                    | Путь введения | Продолжительность терапии                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внебольничная пневмония (тяжелое течение)<br>Нозокомиальная пневмония (НП), в т.ч. НПивл                      | Взрослые: 0,5 г в/в каждые 6 часов<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)                 | в/в           | Внебольничная: 10-14 дней<br>Госпитальная: 14-21 день(до 42 дней при пневмонии, вызванной <i>Pseudomonas</i> ) |
| Абсцесс легкого<br>Деструктивная пневмония<br>Эмпиема плевры                                                  | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)                     | в/в           | 28-42 дня                                                                                                      |
| Интраабдоминальные инфекции, в т.ч. послеоперационный перитонит, инфекционные осложнения острого панкреатита  | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)                     | в/в           | 14-21 день                                                                                                     |
| Тяжелые осложненные инфекции мочевыводящих путей (в т.ч. послеоперационные и у пациентов с катетерами)        | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)                     | в/в           | 10-14 дней                                                                                                     |
| Септический аборт,<br>Послеродовый эндометрит                                                                 | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов                                                                               | в/в           | 10-14 дней                                                                                                     |
| Сепсис (эмпирическая терапия)                                                                                 | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 8 ч.<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки) | в/в           | 14-21 день                                                                                                     |
| Тяжелые инфекции кожи и мягких тканей (раневая, в т.ч. послеоперационная, инфекция, некротизирующие инфекции) | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 8 ч.<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки) | в/в           | 7-10 дней                                                                                                      |
| Фебрильная нейтропения                                                                                        | Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 8 ч.<br>Дети*: 25 мг/кг каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки) | в/в           | 7-10 дней, или до разрешения нейтропении                                                                       |

\* - для детей старше 3 мес.