

## Дозы и режимы введения препарата Левофлоксацин производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Инфекционные обострения ХОБЛ <sup>#</sup>	500 мг каждые 24 часа	в/в	7 дней (рекомендуется ступенчатая терапия)
Внебольничная пневмония	500 мг каждые 24 часа	в/в	7-10 дней
Осложненные ИМВП <sup>##</sup> (в т.ч. пиелит, пиелонефрит, паранефрит)	500 мг каждые 24 часа	в/в	7-14 дней (рекомендуется ступенчатая терапия)
Инфекции кожи и мягких тканей, особенно при непереносимости бета-лактамов	Среднетяжелое течение: 500 мг каждые 24 часа Тяжелое течение: 500 мг каждые 12 часов, или 750 мг каждые 24 часа	в/в	7-10 дней
ВЗОМТ <sup>&amp;</sup>	500 мг в/в каждые 24 часа + метронидазол 500 мг каждые 8 часов <sup>#</sup>	в/в в/в или внутрь	14-21 день
Бактериальный простатит (острый или обострение хронического)	500 мг в/в каждые 24 часа	в/в	28 дней (рекомендуется ступенчатая терапия)
Бактериальные инфекции ЖКТ, в т. ч. эшерихиоз, шигеллез, холера, сальмонеллез, брюшной тиф, паратифы А, В, С, иерсиниоз	200-400 мг каждые 12 часов	в/в	3-5 дней
Сепсис	500 мг каждые 12 часов	в/в	10-14 дней
Туберкулез (в составе комбинированных режимов терапии)	500 мг каждые 24 часа Тяжелое течение: 500 мг каждые 12 ч	в/в	3 мес. (рекомендуется ступенчатая терапия)

<sup>#</sup> - ХОБЛ- хроническая обструктивная болезнь легких

<sup>##</sup> - ИМВП – инфекции мочевыводящих путей

<sup>&</sup> - ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза у женщин