

Дозы и режимы введения препарата Меропенем производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит (в т.ч. посттравматический, послеоперационный и после установки кохлеарных имплантов)	Взрослые: 2 г каждые 8 часов +/- ванкомицин 0,5 г каждые 6 ч Дети*: 40 мг/кг каждые 8 часов +/- ванкомицин 15 мг/кг каждые 6 ч	в/в в/в в/в в/в	До 14 дней
Абсцесс мозга	Взрослые: 2 г каждые 8 часов Дети*: 40 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в	14-21 день
Нозокомиальная пневмония (НП), включая НПивл	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети*: 20 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в	14-21 день
Синусит у пациентов, находящихся на ИВЛ	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети*: 20 мг/кг каждые 8 часов	в/в	7-14 дней
Легочные инфекции у больных с муковисцидозом	Взрослые: 2 г каждые 8 часов Дети*: 40 мг/кг каждые 8 часов	в/в	14-21 день
Интраабдоминальные инфекции, включая вторичный перитонит и инфекционные осложнения панкреатита	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети*: 20-30 мг/кг каждые 8 часов	в/в	7-14 дней
Осложненная ИМВП* (в т.ч. послеоперационная, при наличии мочевого катетера и т.д.)	Взрослые: 0,5-1 г каждые 8 часов Дети*: 10-20 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в	14 дней
Тяжелые осложненные инфекции кожи и мягких тканей	Взрослые: 1 г каждые 8 часов +/- ванкомицин 1 г каждые 12 ч Дети*: 20-30 мг/кг каждые 8 часов +/- ванкомицин 20 мг/кг каждые 12 ч	в/в в/в в/в в/в	10-14 дней
Сепсис (эмпирическая терапия)	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети*: 20-30 мг/кг каждые 8 часов	в/в в/в	10-14 дней
Фебрильная нейтропения	Взрослые: 1 г каждые 8 часов Дети: 20-30 мг/кг каждые 8 часов	в/в	7 дней, или до разрешения нейтропении

* - детям в возрасте старше 3 мес.
- инфекции мочевыводящих путей