Дозы и режимы введения препарата Метронидазол производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса

Локализация инфекции	Доза и кратность введения	Путь введения	Продолжительность терапии
Инфекции ЦНС (в т. ч. абсцессы мозга различного генеза, особенно травматические и отогенные)	Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 12 часов + цефалоспорины III-IV поколений Дети: 7,5 мг/кг каждые 6 часов + цефалоспорины III-IV поколений	в/в в/в в/в в/в	14-21 день
Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры (абсцесс легких, эмпиема плевры)	Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений Дети: 7,5 мг/кг каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений	в/в в/в или в/м в/в в/в или /м	14-21 день
Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный)	Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов + цефалоспорины III-IV поколений, или Фосфомицин 2 г каждые 6 часов или фторхинолоны II-III поколений Дети: 7,5 мг/кг каждые 8 часов + цефалоспорины III-IV поколений или Фосфомицин 200-400 мг/кг/сутки, разделить на 3 введения	в/в в/в или в/м в/в в/в в/в в/в или в/м в/в	7-10 дней
Одонтогенные инфекции (абсцессы, флегмоны лица и шеи)	Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов + ампициллин 1-2 г каждые 6-8 часов или фторхинолоны II-III или кларитромицин 500 мг каждые 12 часов Дети: 7,5 мг/кг каждые 8 часов + ампициллин 15-20 мг/кг каждые 6 часов или кларитромицин (с 6 мес. возраста) – 15 мг/кг/сутки в 2 приема	в/в в/в или в/м в/в или внутрь в/в или внутрь в/в в/в или в/и внутрь	7-14 дней
Осложнения одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области (тромбофлебит вен лица, тромбоз кавернозного синуса, одонтогенный медиастинит)	Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 12 часов + цефалоспорины III-IV поколений или фторхинолоны II-III поколений Дети: 7,5 мг/кг каждые 6-8 часов + цефалоспорины III-IV поколений	в/в в/в или в/м в/в в/в в/в или в/м	14-21 день и более
Инфекции кожи и мягких тканей (раневая инфекция, в т.ч. укушенные и огнестрельные раны, некротизирующие инфекции)	Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений Дети: 7,5 мг/кг каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений	в/в в/в или в/м в/в в/в или в/м	7-14 дней
Воспалительные болезни женских тазовых органов (сальпингит, оофорит, пельвиоперитонит, эндометрит) Послеродовые инфекционные осложнения	Взрослые: 0,5 г каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений +/- доксициклин 100 мг каждые 12 часов	в/в в/в или в/м в/в или per os	10-14 дней, возможна ступенчатая терапия
Сепсис (хирургический, особенно абдоминальный; гинекологический, одонтогенный), эмпирическая терапия	Взрослые: 0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 12 часов + цефалоспорины III-IV поколений или фторхинолоны II-III поколений Дети: 7,5 мг/кг каждые 6-8 часов + цефалоспорины III-IV поколений	в/в в/в в/в в/в в/в	14-21 день
В качестве радиосенсибилизирующего средства при лучевой терапии злокачественных опухолей	160 мг/кг или 4-6 г/кв. м (макс. доза - 10 г) поверхности тела за 1 ч. перед каждым сеансом облучения	в/в	7-14 дней
Периоперационная антибиотикопрофилактика (операции на толстой и прямой кишке, аппендэктомия, гинекологические операции)	Взрослые: 0,5-1 г, начать инфузию за 60-90 мин. до разреза, продолжительность инфузии 0,5 г — не менее 30 мин.; по показаниям — 0,5 г через 8 и 16 часов после операции + цефалоспорины I-III поколений или Фосфомицин	в/в	