

Стандартные режимы химиотерапии (согласно "Инструкции по химиотерапии больных туберкулезом")

Режим	Фаза курса химиотерапии	
	интенсивная	продолжения
I	2HRZE/S	4 <4> HR <1>/4H3R3 <1> 6HR <2>/6H3R3 <2> 6HR <2>/6H3R3 <2> 6HE 6HZE <3>/6H3Z3E3 <3>
IIa	2HRZES + 1HRZE	5HRE/5H3R3E3 6HRE <3>/6H3R3E3 <3>
IIб	3HRZE[Pt][Cap]/[K][Fq]	В соответствии с режимами I, IIa или IV в зависимости от лекарственной чувствительности микобактерий
III	2HRZE 2HRZ/E/S <3>	4HR/4H3R3 6HE
IV	Минимум 5 препаратов, к которым сохранена чувствительность [ZEPTCap/KFq] [Rb][Cs][PAS] Длительность фазы не менее 6 мес.	Минимум 3 препарата, к которым сохранена чувствительность [EPTFq] [Rb][Cs][PAS] Длительность фазы не менее 12 мес.

<1> При туберкулезе органов дыхания.

<2> При внелегочном туберкулезе, при туберкулезе любых локализаций у детей и подростков.

<3> При туберкулезе любых локализаций у детей и подростков.

<4> Продолжительность курса химиотерапии в месяцах.

Сокращения: H - изониазид, **R** - рифампицин, Z - пиразинамид, E - этамбутол, S - стрептомицин, Rb - рифабутин, K - канамицин/амикацин, Pt - протионамид, **Cap** - капреомицин, Fq - препараты из группы фторхинолонов, Cs - циклосерин, PAS - ПАСК.