

**Режимы химиотерапии МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ (согласно
Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению
туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя (2013))**

Режим	Фазы курса химиотерапии	
	Интенсивная	Фаза продолжения
IV	8* Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto [Km/Am] [E] [Mfx]	12-18* Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto [E] [Mfx]
V	8* Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd [E] [Pto/Eto] [Amx Imp Clr Mp]	12-18* Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd [E] [Pto/Eto] [Amx Imp Clr Mp]

Сокращения: Z – пиразинамид, E – этамбутол, **Km** – канамицин, **Am** – амикацин, Pto – протионамид, Eto – этионамид, **Cm** – капреомицин, **Fq** – фторхинолон, **Lfx** – левофлоксацин, **Mfx** – моксифлоксацин, Cs – циклосерин, Trd – теризидон, **PAS** – аминосалициловая кислота, Lzd- линезолид, **Amx** – амоксициллин с клавулановой кислотой, **Imp** - имипенем с циластатином, Clr – кларитромицин, **Mp** – меропенем.

* - продолжительность курса (в месяцах).