

Режимы химиотерапии, основанные на результатах определения чувствительности микобактерии туберкулеза молекулярно-генетическими методами (согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (2013)).

Результат ТЛЧ МГМ					Режим химиотерапии до результатов ТЛЧ на плотных или жидких средах	Режим химиотерапии при отсутствии роста на плотных и жидких средах	
H	R	Ofx	E	Am/Cm			
Не определена	ЛУ	Не определена	Не определена	Не определена	4	Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto	8* Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto/ 12-18 Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto
ЛУ	ЛУ	ЛЧ	Не определена	Не определена	4	Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto	8* Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto/ 12 Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto
ЛУ	ЛУ	ЛУ	Не определена	Не определена	5	Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd Amx / Imp /Clr / H	8** Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd Amx / Imp /Clr / H/ 12-18 Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd Amx / Imp /Clr
ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛЧ	ЛЧ	4	Cm Lfx E Z Cs/Trd PAS	8* Cm Lfx E Z Cs/Trd PAS / 12-18 Lfx E Z Cs/Trd PAS
ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛЧ	4	Cm Mfx E Z Cs/Trd PAS	8* Cm Mfx E Z Cs/Trd PAS/ 12-18 Mfx E Z Cs/Trd PAS
ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛУ	ЛЧ	4	Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto	8* Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto/ 12-18 Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto
ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛУ	5	Cm Mfx E Z Cs/Trd PAS Lzd	8** Cm Mfx E Z Cs/Trd PAS Lzd/ 12-18 Mfx E Z Cs/Trd PAS Lzd
ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛЧ	4	Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd	8* Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd/ 12-18 Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd
ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛУ	ЛУ	4	Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto	8* Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto/ 12-18 Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto
ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛУ	5	Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd Amx / Imp /Clr / H	8** Cm Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd Amx / Imp /Clr / H/ 12-18 Mfx Z Cs/Trd PAS Lzd Amx / Imp /Clr
ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛЧ	ЛУ	4	Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto	8* Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto/ 12-18 Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto
ЛУ	ЛУ	ЛУ	ЛЧ	ЛЧ	4	Cm Mfx E Z Cs/Trd PAS	8* Cm Mfx E Z Cs/Trd PAS/ 12-18 Mfx E Z Cs/Trd PAS

Сокращения: ЛУ – лекарственная устойчивость; ЛЧ – лекарственная чувствительность; Z – пипразинамид, E – этамбутол, Km – канамицин, Am – амикацин, Pto – протинамид, Eto – этионамид, Cm – капреомицин, Fq – фторхинолон Lfx – левофлоксацин, Mfx – моксифлоксацин, Cs – циклосерин, Trd – теризидон, PAS – аминосалициловая кислота, Lzd- линезолид, Amx – амоксициллин с клавулановой кислотой, Imp – имипенем с циластатином, Clr – кларитромицин, Mr – меропенем.

* до получения двух последовательных отрицательных результатов посева с интервалом в один месяц;

** до получения четырех последовательных отрицательных результатов посева с интервалом в один месяц.